

General Disclaimer

One or more of the Following Statements may affect this Document

- This document has been reproduced from the best copy furnished by the organizational source. It is being released in the interest of making available as much information as possible.
- This document may contain data, which exceeds the sheet parameters. It was furnished in this condition by the organizational source and is the best copy available.
- This document may contain tone-on-tone or color graphs, charts and/or pictures, which have been reproduced in black and white.
- This document is paginated as submitted by the original source.
- Portions of this document are not fully legible due to the historical nature of some of the material. However, it is the best reproduction available from the original submission.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

RECEIVED BY
NASA STI FACILITY
DATE: 5/16/83
DCAF/NO. 172625
PROCESSED BY
 NASA STI FACILITY
 ESA - SDS AIAA



INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

1. Publicação nº <i>INPE-2708-PRE/296</i>	2. Versão	3. Data <i>AbriZ, 1983</i>	5. Distribuição <input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Restrita
4. Origem <i>DGA</i>	Programa <i>OZÔNIO</i>		
6. Palavras chaves - selecionadas pelo(s) autor(es) <i>OZÔNIO MEDIDAS DE OZÔNIO SONDAS ECC</i>			
7. C.D.U.: <i>551.534</i>			
8. Título <i>MEDIDAS DE OZÔNIO NA TROPOSFERA E ESTRATOSFERA DE NATAL</i>		10. Páginas: <i>19</i>	
		11. Última página: <i>11</i>	
9. Autoria <i>V.W.J.H. Kirchhoff A.G. Motta</i>		12. Revisada por <i>Rene A. Medrano-B</i>	
Assinatura responsável <i>Kirchhoff</i>		13. Autorizada por <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>	
14. Resumo/Notas <i>Natal tem sido a base de operação de um programa regular de medidas de densidade de ozônio usando sondas do tipo ECC. O objetivo desta apresentação é mostrar os principais resultados obtidos até o presente. A densidade de ozônio em Natal, na troposfera, é 30% maior do que a média de dados obtidos em outras estações equatoriais. Os valores de conteúdo total também são 15% maiores do que os resultados publicados em medidas de satélite. Estes resultados são de importância fundamental, porque mostram que os perfis usados atualmente na calibração dos dados de radiancia dos satélites são inadequados.</i>			
ORIGINAL PAGE IS OF POOR QUALITY			
15. Observações <i>Trabalho a ser apresentado na 35ª reunião anual da SBPC.</i>			

ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY

AGRADECIMENTOS

Queremos agradecer a colaboração sempre eficiente de to do pessoal da Barreira do Inferno sob o comando do Cel. Sidnei Azambuja, e ao pessoal do INPE-NATAL responsável pelo lançamento dos balões. Que remos agradecer também a E. Hilsenrath, da NASA, pela constante troca de correspondência sobre assuntos ligados ao ozônio atmosférico e sua medida. Y. Sahai tem sido o responsável pela operação dos Dobson, e I. J. Kantor tem nos apoiado muito em nosso trabalho.

ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY

ABSTRACT

Ozone densities have been measured in the troposphere and stratosphere of Natal using ECC sondes launched on balloons, as part of a long term program of cooperation between NASA and INPE. The data analysed so far show tropospheric densities and total ozone contents larger than expected.

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
LISTA DE FIGURAS	<i>vii</i>
1. <u>INTRODUÇÃO</u>	1
2. <u>RESULTADOS</u>	2
3. <u>CONCLUSÕES</u>	10
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

PRECEDING PAGE BLANK NOT FILMED

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
1 - Exemplo típico de dados obtidos pela sonda ECC	4
2 - Superposição dos perfis de O_3 obtidos entre 1978 e 1981 em Natal	5
3 - Superposição dos perfis de temperatura obtidos entre 1978 e 1981 em Natal	6
4 - Perfil médio de ozônio (linha contínua) entre limites de máximo e mínimo (linhas tracejadas) e comparação com a média de outros dados de baixa latitude (traço x), e também a variação anual média do conteúdo total de ozônio, inserido no canto direito inferior, medida pelas sondas ECC e por um fotômetro Dobson	7
5 - Perfil médio do ozônio troposférico que evidencia a região do pico secundário	8

PRECEDING PAGE BLANK NOT FILMED

1. INTRODUÇÃO

O ozônio (O_3) é um constituinte minoritário normal da atmosfera terrestre. O interesse em todo mundo de estudar esta molécula se deve ao fato de que o ozônio tem a capacidade de absorver a radiação ultravioleta solar que, de outro modo, teria efeitos danosos sobre os seres vivos. O conhecimento da densidade do ozônio em função de altura e suas variações no tempo são, portanto, muito importantes para se avaliar, por exemplo, se a ação poluidora do homem pode causar um desequilíbrio ou mesmo aniquilação da camada de ozônio.

As densidades de ozônio na troposfera e estratosfera são medidas por sondas lançadas em balões que podem atingir até 35 km de altura. Uma das sondas mais usadas atualmente nesta tarefa é a do tipo ECC - Electrochemical Concentration Cell - (Komhyr and Harris, 1971), também usada para as medidas feitas em Natal, a serem descritas. O conteúdo total de ozônio, isto é, a integral de densidade com a altura pode ser também determinada indiretamente através do espectrofotômetro Dobson, cujos resultados são muitas vezes usados para normalizar os dados das sondas. Em Natal opera-se um instrumento Dobson em colaboração com a NOAA.

O programa de medidas de ozônio de Natal, mais especificamente, da base de lançamento de foguetes da Barreira do Inferno operada pela Força Aérea Brasileira, teve início com o interesse da NASA de expandir as suas bases normais de monitoramento de ozônio. A localização geográfica de Natal é de importância estratégica neste particular. Foi firmado, então, um acordo de cooperação entre a NASA e a COBAE-INPE no sentido de obter dados de ozônio usando sondas em balão e foguetes. A NASA ficou encarregada de fornecer as sondas e o INPE de efetuar os lançamentos, e os dados obtidos podem ser usados por ciêntistas americanos e brasileiros. Os resultados preliminares foram publicados em Kirchhoff et alii (1981).

2. RESULTADOS

ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY

Os dados obtidos resultaram do lançamento de 56 sondas ECC, em balões, entre novembro de 1978 e outubro de 1981. Os resultados de um lançamento típico são mostrados na Figura 1, para ozônio e temperatura. O ozônio e sua variação com a altura são medidos em termos de pressão parcial, em função da pressão atmosférica, e a temperatura em $^{\circ}\text{Celsius}$. No caso, o balão atingiu o limite superior de 4 mbar. O pico principal do ozônio está em 17 mbar, com uma pressão parcial de 130 nbar, mas também um pico secundário na troposfera pode ser notado em torno de 500 mbar e com uma pressão parcial de 30 nbar. As linhas curvas representam isolinhas de razão de mistura constante. Embora neste trabalho o enfoque seja no ozônio, outros parâmetros atmosféricos são medidos pelas sondas, como temperatura, umidade relativa, e ventos. A tropopausa, definida no mínimo de temperatura na Figura 1, está em 100 mbar a uma temperatura de -80°C . Todos os dados obtidos são apresentados num gráfico como o da Figura 1. Deve-se notar que o pico secundário da troposfera não é uma característica que aparece em todas as medidas, mas é bem aparente numa média ou num gráfico de superposição, como o da Figura 2.

A Figura 2 mostra uma superposição de todos os pontos dos vários lançamentos efetuados. Deve-se notar que a abcissa agora é a densidade. O pico secundário do ozônio na troposfera está bem visível. A Figura 3 mostra a superposição dos valores medidos de temperatura que indicam uma variabilidade muito pequena na troposfera de Natal.

O perfil médio do ozônio medido em Natal é mostrado na Figura 4, bem como a variação anual média do conteúdo total, e comparações. Os eixos agora são altura em km e densidade de ozônio em 10^{12}cm^{-3} . A curva média, em traço contínuo, mostra claramente a posição dos pontos críticos do perfil. As linhas tracejadas são perfis médios obtidos durante os períodos de mínimo (em torno do dia 120) e de máximo (em torno do dia 260) conteúdo total. As barras horizontais indicam o des

vio-padrão. As curvas médias são comparadas com outra média (indicada por segmentos —x—) a qual foi obtida de vários lugares situados entre $\pm 30^\circ$ de latitude (Hilsenrath and Dunn, 1979). A variação anual para o conteúdo total ou abundância do O_3 mostra uma tendência de acompanhar as variações medidas pelo Dobson, mas há diferenças significativas em termos de valor absoluto.

A Figura 5 merece destaque pelo pico secundário do ozônio que, no caso de Natal, é bem significativo. As curvas assinaladas (1) e (4) são soluções teóricas estáveis para fluxo nulo e fluxo constante, respectivamente, isto é, são soluções dinâmicas que desprezam efeitos fotoquímicos da troposfera. Uma outra possibilidade, no entanto, seria exatamente uma ação fotoquímica não-convencional em que uma produção localizada P seria contrabalançada por um gradiente no fluxo vertical. Esta é a interpretação que se propõe para explicar os dados de Natal. Pode-se mostrar que, nestas condições, pode-se escrever para o fluxo vertical do ozônio,

$$\phi = -Kn(\delta-H) / H\delta,$$

onde K é o coeficiente de difusão turbulenta, que se supõe constante com a altura, n é a densidade do ozônio, δ a escala de altura para a densidade do ozônio, indicada na Figura 5, e H a escala de altura para a densidade atmosférica. O sinal (-) indica que o fluxo se dirige para baixo. Pode-se notar que, quando $\delta=H$, o fluxo torna-se nulo e tem-se o caso (1) da Figura. No caso $\delta \rightarrow \infty$ tem-se o caso (4) da Figura, com fluxo vertical constante com altura, $\phi = -Kn/H$. Se o regime dominante é o proposto, pode-se escrever também que

$$P = K(\delta-H)n / \delta^2 H$$

e, portanto, a densidade do ozônio é proporcional à sua produção como se dominasse o equilíbrio fotoquímico. Esta constatação justifica a maior variabilidade de n em torno do pico do ozônio troposférico, como se pode ver na Figura 2.

ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY




Fig. 1 Exemplo típico de dados obtidos pela sonda ECC. As variações do ozônio (O₃, dado em micro-milibras de pressão parcial) e temperatura (TEMP, dado em °Celsius) são mostrados em função da pressão atmosférica.

ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY

- 5 -
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY




Fig. 2 Superposição dos perfis de O_3 obtidos entre 1978 e 1981 em Natal.

ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY




Fig. 3 Superposição dos perfis de temperatura obtidos em
tre 1978 e 1981 em Natal.




Fig. 4 Perfil médio de ozônio (linha contínua) entre limites de máximo e mínimo (linhas tracejadas) e comparação com a média de outros dados de baixa latitude (traço x), e também a variação anual média do conteúdo total de ozônio, inserida no canto direito inferior, medida pelas sondas ECC e por um fotômetro Dobson.




Fig. 5 Perfil médio do ozônio troposférico que evidencia a região do pico secundário.

δ é a escala de altura correspondente à curva e os casos 1 e 4 são soluções teóricas estáveis para fluxo nulo e fluxo máximo, respectivamente.

Na Tabela 1 destacam-se vários parâmetros de interesse na troposfera tais como a abundância do ozônio, os máximos e mínimos, a escala de altura, bem como alguns parâmetros calculados como o fluxo, constantes de tempo, e produção máxima. Deve-se notar, finalmente, que matematicamente pode-se obter também um pico secundário na troposfera através de uma variação de K com altura. Esta possibilidade, embora não totalmente impossível, parece pouco provável levando-se em conta que a grande maioria dos autores usa K constante com altura nos modelos da troposfera.

Tabela 1. Parâmetros de interesse na troposfera.

NOME	VALOR	NOTA
Abundância, A	$7.5 \times 10^{17} \text{cm}^{-2}$	m
$O_3(\text{max})$	$7.4 \times 10^{11} \text{cm}^{-3}$	m
$O_3(\text{min})$	$4.1 \times 10^{11} \text{cm}^{-3}$	m
$h(\text{min})$	13.0 km	m
$h(\text{max})$	3.1 km	m
K	$1.0 \times 10^5 \text{cm}^2 \text{s}^{-1}$	a
$\phi(\text{min})$	$6.3 \times 10^{10} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1} (H=6.5 \times 10^5 \text{cm})$	c
$\phi(\text{max})$	$8.9 \times 10^{10} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1} (H=8.3 \times 10^5 \text{cm})$	c
$\Delta\phi = \phi(\text{max}) - \phi(\text{min})$	$2.6 \times 10^{10} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$	c
δ	16.8 km	m
$\tau_\phi = A/\phi(\text{min})$	$1.2 \times 10^7 \text{s} = 4.6 \text{ meses}$	c
$\tau = H^2/K$	$6.9 \times 10^6 \text{s} = 2.7 \text{ meses}$	c
P(max)	$2.7 \times 10^4 \text{cm}^{-3} \text{s}^{-1}$	c

m - Das medidas de Natal

a - Adotado

c - Calculado

3. CONCLUSÕES

Alguns aspectos dos dados de ozônio medidos na troposfera e estratosfera de Natal, entre os períodos de 1978 e 1981, foram apresentados. Entre os principais resultados pode-se citar:

- 1) A densidade média do ozônio na troposfera é 30% maior do que os resultados obtidos em outras estações de baixa latitude.
- 2) O conteúdo total de ozônio também é maior do que o esperado, sendo da ordem de 15%.
- 3) Um pico de ozônio pode ser observado na troposfera, em várias ocasiões. Nossa interpretação é de que, nesta região, existe uma fonte de produção de ozônio contrabalançada por uma divergência do fluxo vertical.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HILSEN RATH, E., and DUNN P.J. Standard ozone profiles from balloon and rocket data for satellite and theoretical input, paper presented at the Spring AGU meeting, Washington DC, 1979.

KIRCHHOFF, V.W.J.H. , SAHAI, Y., and MOTTA, A.G. First ozone profiles measured with ECC sondes at Natal (5.9°S, 35.2°W), *Geophys. Res. Lett.*, 8, 1171-1172, 1981.

KOMHYR, W.D., and HARRIS, T.B. *Development of an ECC ozonesonde*, NOAA Technical report ERL-APCL 18, Boulder, Colorado, 1971.